

Kolonoskopie Oorsig en Aanvullende Prosedure Inligting

Lees asseblief voor die prosedure

Wat is 'n Kolonoskopie?

'n Kolonoskopie is 'n dag-kliniek prosedure waar die binnekant van die dikderm (kolon en rektum) ondersoek word. 'n Kolonoskopie word algemeen gebruik om 'n diagnose te maak van gastro-intestinale simptome soos rektale of intestinale bloeding of verandering in stoelgang gewoontes.

'n Kolonoskopie word ook aanbeveel vir individue sonder simptome om ondersoek te doen vir kolorektale kanker of poliepe.

'n Roetine kolonoskopie word aanbeveel vir persone ouer as 50 jaar en is noodsaaklik vir persone met 'n familie geskiedenis van kolonkanker of poliepe.

Wat Gebeur voor 'n Kolonoskopie?

Om 'n suksesvolle kolonoskopie te kan doen moet die kolon skoon wees sodat die geneesheer die kolonwand duidelik kan sien.

Dit is dus baie belangrik dat u die instruksies vir kolon reiniging 'n paar dae voor die prosedure lees en navolg. Indien die voorbereiding nie streng gevolg is nie, is dit moontlik dat die kolonoskopie nie suksesvol afgehandel kan word nie, en moet die prosedure, waarskynlik op u eie onkoste, herhaal word.

U mag moontlik irritasie van die vel rondom die anus ervaar as gevolg van los stoelgange.

Hierdie irritasie kan verlig word deur die volgende te doen:

- **Wend 'n dun lagie Vaseline aan om die anus voor u PicoPrep drink en na elke stoelgang.**
- Vee af met watte wat in warm water geweek is eerder as om toiletpapier te gebruik.
- Sit in 'n bad warm water, droog af met 'n sagte lappie en wend Vaseline aan.

Wat Gebeur tydens 'n kolonoskopie?

Die dokter gaan 'n lang buigsame instrument in die rektum plaas en na die begin van die dikderm beweeg. Indien nodig kan weefsel vir toetsing (biopsie) geneem word, en poliepe kan gesien en verwys word.

'n Kolonoskopie kan akkurate diagnose en behandeling van kolorektale probleme toelaat sonder dat 'n groot operasie gedoen hoef te word. Die instrument word na elke prosedure gesteriliseer.

U sal op die linkersy lê en 'n aarbuis (drip) sal ingesit word. 'n Kalmeermiddel en pynstiller sal daardeur toegedien word om u gedurende die prosedure te laat ontspan. U sal suurstof ontvang om 'n normale bloedsuurstofvlak te handhaaf en u lewensfunksies sal gemonitor word.

Die prosedure duur gemiddeld 20-40 minute en u sal toegelaat word om na die prosedure te rus tot u heeltemal wakker is. Na die prosedure mag u effens ongemaklik en opgeblaas voel as gevolg van lug wat in u kolon geblaas is om sigbaarheid in die derm te verbeter.

Wat Gebeur na 'n kolonoskopie?

U sal in die herstelkamer bly vir waarneming tot u gereed is om ontslaan te word.

Krampe en winderigheid kan voor kom, maar dit is van korte duur.

As gevolg van sedasie sal u lomerig voel, en moet 'n verantwoordelike persoon u huis toe neem.

U moet nie motor bestuur of swaar masjinerie hanteer vir die volgende 24 uur nie.

Vermy alkohol en neem 'n kurses **QuattroFlora** kapsules om intestinale flora te herstel.

U mag met 'n normale dieët voortgaan na die kolonoskopie tensy anders deur u dokter aanbeveel.

Wag tot die dag na die kolonoskopie voor u met fisiese aktiwiteite soos oefening voortgaan.

Indien poliepe verwys of 'n biopsie gedoen is, moet u aspirien en anti-inflammatoryiese middels vir 2 weke vermy. Paracetamol bv. Panado mag geneem word indien nodig. As u anti-koagulante bv.

Warfarin of Plavix gebruik, sal u dokter aanbeveel wanneer dit veilig is om weer die medikasie te neem.

Effense rektale bloeding mag voor kom vir 1-2 dae na die prosedure as 'n biopsie gedoen of poliepe verwys

Indien u swaarder bloeding of bloedklonte ervaar, of as u erge abdominale pyn het, moet u dit onmiddellik aanmeld. Indien u dokter nie beskikbaar is nie, moet u na die hospitaal waar die prosedure gedoen is, gaan.